

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη

Arippezil 5 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Arippezil 10 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
 Υδροχλωρική δονεπεξίλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι' αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών

1. Τι είναι το Arippezil και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Arippezil
3. Πώς να πάρετε το Arippezil
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Arippezil
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Arippezil και ποια είναι η χρήση του

Το Arippezil περιέχει τη δραστική ουσία υδροχλωρική δονεπεξίλη. Το Arippezil (υδροχλωρική δονεπεξίλη) ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης. Η δονεπεξίλη αυξάνει τα επίπεδα μιας ουσίας (ακετυλοχολίνης) στον εγκέφαλο, που εμπλέκεται στη λειτουργία της μνήμης, επιβραδύνοντας τη διάσπαση της ακετυλοχολίνης.

Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της άνοιας, σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με ήπια έως μετρίως σοβαρή νόσο Alzheimer. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αυξανόμενη απώλεια μνήμης, σύγχυση και αλλαγές στη συμπεριφορά. Ως αποτέλεσμα, οι πάσχοντες από τη νόσο Alzheimer, δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να διεξάγουν τις φυσιολογικές καθημερινές τους δραστηριότητες.

Το Arippezil προορίζεται για χρήση μόνο από ενήλικες ασθενείς.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Arippezil

Μην πάρετε το Arippezil

Σε περίπτωση αλλεργίας στην υδροχλωρική δονεπεξίλη ή σε παράγωγα πιπεριδίνης ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Arippezil, εάν έχετε ή είχατε:

- γαστρικά ή δωδεκαδακτυλικά έλκη.

- επιληπτικές κρίσεις (κρίσεις) ή σπασμούς.
- καρδιακή πάθηση (όπως ακανόνιστος ή πολύ αργός καρδιακός παλμός, καρδιακή ανεπάρκεια, έμφραγμα του μυοκαρδίου).
- καρδιακή πάθηση που ονομάζεται «παράταση του διαστήματος QT» ή ιστορικό ορισμένων μη φυσιολογικών καρδιακών ρυθμών που ονομάζονται ταχυκαρδίες δίκην ριπιδίου ή εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας εμφανίζει «παράταση του διαστήματος QT».
- χαμηλά επίπεδα μαγνησίου ή καλίου στο αίμα σας.
- άσθμα ή άλλη μακροχρόνια πνευμονοπάθεια.
- ηπατικά προβλήματα ή ηπατίτιδα.
- δυσκολία στην ούρηση ή ήπια νόσο των νεφρών.

Επίσης ενημερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος.

Παιδιά και έφηβοι

Το Aripezil δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών).

Άλλα φάρμακα και Aripezil

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Να συμπεριλάβετε και φάρμακα τα οποία δε σας έχει συνταγογραφήσει γιατρός, αλλά έχετε αγοράσει εσείς οι ίδιοι από κάποιο φαρμακείο. Αυτό ισχύει και για τα φάρμακα που μπορεί να πάρετε κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν συνεχίζετε να παίρνετε το Aripezil, διότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να μειώσουν ή να ενισχύσουν τη δράση του Aripezil.

Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε κάποιον από τους ακόλουθους τύπους φαρμάκων:

- φάρμακα για προβλήματα καρδιακού ρυθμού (π.χ. αμιωδαρόνη, σοταλόλη και κινιδίνη).
- αντικαταθλιπτικά φάρμακα (π.χ. σιταλοπράμη, εσιταλοπράμη, αμιτριπτυλίνη, φθοροξετίνη)
- αντιψυχωσικά φάρμακα (π.χ. πιμοζίδη, σερεντιδόλη, ζιπρασιδόνη)
- φάρμακα για βακτηριακές λοιμώξεις (όπως κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη, λεβοφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη, ριφαμπικίνη).
- αντιμυκητιασικά, π.χ. κετοконаζόλη.
- άλλα φάρμακα για τη νόσο Alzheimer, π.χ. γκαλανταμίνη.
- παυσίπονα ή φάρμακα για τη θεραπεία της αρθρίτιδας, π.χ. ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) όπως ιμπουπροφαίνη ή νατριούχο δικλοφενάκη.
- αντιχολινεργικά φάρμακα, π.χ. τολτεροδίνη.
- αντισπασμωδικά, π.χ. φαιντοΐνη, καρβαμαζεπίνη.
- φάρμακα για κάποια καρδιακή πάθηση, π.χ. κινιδίνη, βήτα αποκλειστές (προπανολόλη και ατενολόλη).
- μυοχαλαρωτικά, π.χ. διαζεπάμη, σουκινυλοχολίνη.
- γενικά αναισθητικά.
- φάρμακα που αγοράστηκαν χωρίς ιατρική συνταγή, π.χ. φυτικά φάρμακα.

Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση που απαιτεί γενική αναισθησία, πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας και τον αναισθησιολόγο ότι παίρνετε Aripezil. Αυτό συμβαίνει επειδή το φάρμακό σας μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα του αναισθητικού που απαιτείται.

Το Aripezil μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με νεφρική νόσο ή ήπια έως μέτρια ηπατική νόσο. Ενημερώστε πρώτα το γιατρό σας, εάν έχετε νόσο των νεφρών ή του ήπατος. Οι ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο δε θα πρέπει να παίρνουν το Aripezil.

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για το όνομα του ανθρώπου που σας φροντίζει. Ο

άνθρωπος που σας φροντίζει θα σας βοηθήσει να παίρνετε το φάρμακό σας όπως σας έχει συνταγογραφηθεί.

Το Arippezil με τροφή, ποτό και οινοπνευματώδη

Η τροφή δε θα επηρεάσει τη δράση του Arippezil.

Το Arippezil δε θα πρέπει να λαμβάνεται μαζί με οινοπνευματώδη, επειδή τα οινοπνευματώδη μπορεί να μεταβάλλουν τη δράση του.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Το Arippezil δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Η νόσος Alzheimer μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα και δεν πρέπει να διεξάγετε αυτές τις δραστηριότητες, εκτός κι αν ο γιατρός σας είπε ότι είναι ασφαλές να τις κάνετε.

Επίσης, το φάρμακό σας μπορεί να προκαλέσει κούραση, ζάλη και μυϊκές κράμπες. Εάν εμφανίσετε κάποια από αυτές τις επιδράσεις, δεν πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανήματα.

Το Arippezil περιέχει λακτόζη

Αν ο γιατρός σας σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.

3. Πώς να πάρετε το Arippezil

Πόσο Arippezil πρέπει να πάρετε

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αρχικά, η συνιστώμενη δόση είναι 5 mg κάθε βράδυ, πριν πάτε για ύπνο. Μετά από ένα μήνα, ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να παίρνετε 10 mg κάθε βράδυ, πριν πάτε για ύπνο. Η περιεκτικότητα του δισκίου που θα παίρνετε μπορεί να μεταβληθεί, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που λαμβάνετε το φάρμακο και με το τι συνιστά ο γιατρός σας. Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι 10 mg κάθε βράδυ.

Να ακολουθείτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας, σχετικά με το πώς και πότε πρέπει να παίρνετε το φάρμακό σας. Μην αλλάξετε τη δόση μόνοι σας, χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας.

Πώς να πάρετε το φάρμακό σας

Να καταπίνετε το δισκίο Arippezil με ένα ποτήρι νερό, πριν πάτε για ύπνο το βράδυ.

Εάν έχετε μη φυσιολογικά όνειρα, εφιάλτες ή δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε (βλ. παράγραφο 4) ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει να παίρνετε το Arippezil το πρωί.

Χρήση σε παιδιά και εφήβους

Το Arippezil δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας κάτω των 18 ετών).

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Arippezil από την κανονική

Επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό σας ή το τμήμα επειγόντων περιστατικών του κοντινότερού σας νοσοκομείου, εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση φαρμάκου από την κανονική. Να πάρετε μαζί σας αυτό το φύλλο οδηγιών και όσα δισκία σας έχουν απομείνει.

Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας) και

έμετο (αδιαθεσία), έκκριση σιέλου από το στόμα, εφίδρωση, αργό καρδιακό ρυθμό, χαμηλή αρτηριακή πίεση (αίσθημα ζάλης ή ζάλη όταν στέκεστε όρθιοι), προβλήματα στην αναπνοή, απώλεια συνείδησης και επιληπτικές κρίσεις (κρίσεις) ή σπασμούς.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Arippezil

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το φάρμακό σας, πάρτε την επόμενη δόση στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το φάρμακό σας για περισσότερο από μια βδομάδα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε επιπλέον φάρμακο.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Arippezil

Μη σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία, εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Arippezil, τα οφέλη από τη θεραπεία σας θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Για πόσο καιρό πρέπει να παίρνετε το Arippezil

Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας θα σας συμβουλεύσει για πόσο καιρό θα πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε τα δισκία σας. Θα πρέπει να επισκέπτεστε το γιατρό σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επανεξετάζει τη θεραπεία σας και να αξιολογεί τα συμπτώματά σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί από ανθρώπους που παίρνουν Arippezil.

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε κάποια από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες ενώ παίρνετε Arippezil.

Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες

Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας, εάν παρατηρήσετε αυτές τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται. Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική θεραπεία:

- ηπατική βλάβη, π.χ. ηπατίτιδα. Τα συμπτώματα της ηπατίτιδας είναι ναυτία (αίσθημα αδιαθεσίας) ή έμετος (αδιαθεσία), απώλεια της όρεξης, αίσθημα γενικής αδιαθεσίας, πυρετός, φαγούρα, κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών και σκουρόχρωμα ούρα (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 1.000 άτομα).
- γαστρικά ή δωδεκαδακτυλικά έλκη. Τα συμπτώματα των ελκών είναι πόνος στο στομάχι και δυσφορία (δυσπεψία) που εντοπίζεται ανάμεσα στον ομφαλό και στο στήννο (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 100 άτομα).
- αιμορραγία στο στομάχι ή στα έντερα. Αυτό μπορεί να σας προκαλέσει μαύρα σαν πίσσα κόπρανα ή ορατή αιμορραγία από το ορθό (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 100 άτομα).
- επιληπτικές κρίσεις (κρίσεις) ή σπασμοί (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 100 άτομα).
- πυρετός με μυϊκή δυσκαμψία, εφίδρωση ή μειωμένο επίπεδο συνείδησης (μία διαταραχή που ονομάζεται «Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο») (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 10.000 άτομα).
- μυϊκή αδυναμία, ευαισθησία ή πόνος, και ιδίως εάν ταυτόχρονα αισθάνεστε αδιαθεσία, έχετε υψηλή θερμοκρασία ή σκουρόχρωμα ούρα. Μπορεί να προκαλούνται από μη φυσιολογική μυϊκή διάσπαση, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή και να οδηγήσει σε νεφρικά προβλήματα (πάθηση γνωστή ως ραβδομυόλυση) (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 10.000 άτομα).
- γρήγορος, ακανόνιστος καρδιακός παλμός και λιποθυμία, τα οποία θα μπορούσαν να είναι συμπτώματα απειλητικής για τη ζωή κατάστασης, γνωστής ως ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου

(Torsade de Pointes) (η συχνότητα δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):

- διάρροια.
- πονοκέφαλος.

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα):

- μυϊκή κράμπα.
- κούραση.
- δυσκολία στον ύπνο (αϋπνία).
- κοινό κρυολόγημα.
- ψευδαισθήσεις (το να βλέπετε ή να ακούτε πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα).
- ασυνήθη όνειρα, συμπεριλαμβανομένων των εφιαλτών.
- διέγερση.
- επιθετική συμπεριφορά.
- λιποθυμία.
- ζάλη.
- ενόχληση στο στομάχι.
- εξάνθημα.
- ακράτεια ούρων.
- πόνος.
- ατυχήματα (ασθενείς μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς σε πτώσεις και τυχαίους τραυματισμούς).

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

- αργός καρδιακός ρυθμός.
- υπερέκκριση σιέλου.

Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα):

- δυσκαμψία, τρέμουλο ή ανεξέλεγκτη κίνηση, ιδιαίτερα του προσώπου και της γλώσσας, αλλά και των άκρων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες μη γνωστής συχνότητας (δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):

- μεταβολές στην καρδιακή δραστηριότητα που φαίνονται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και ονομάζονται «επιμήκυνση του διαστήματος QT».
- αυξημένη γενετήσια ορμή, υπερσεξουαλικότητα.
- σύνδρομο Pisa (μια κατάσταση που περιλαμβάνει ακούσια συστολή των μυών με μη φυσιολογική κάμψη του κορμού και της κεφαλής προς τη μία πλευρά).

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr>). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Arippezil

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν τα παιδιά.

Να μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και την κυψέλη μετά το «EXP». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Arippezil

- Η δραστική ουσία είναι η υδροχλωρική δονεπεξίλη.

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Arippezil 5 mg περιέχει 5 mg υδροχλωρικής δονεπεξίλης.

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Arippezil 10 mg περιέχει 10 mg υδροχλωρικής δονεπεξίλης.

- Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου: μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο.

Επικάλυψη δισκίου: υπρομελλόζη 2910/υπρομελλόζη 5cP (E464), διοξείδιο τιτανίου (E171), προπυλενογλυκόλη, τάλκη.

Εμφάνιση του Arippezil και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Arippezil 5 mg είναι: λευκά, στρογγυλά, με διάμετρο 7,5 mm περίπου.

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Arippezil 10 mg είναι: λευκά, στρογγυλά, με διάμετρο 9,3 mm περίπου και με μία διαχωριστική γραμμή στη μία πλευρά.

Το Arippezil διατίθεται σε συσκευασίες των 28, 56, 84 και 98 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων, σε κυψέλες (blisters) από PVC/PE/PVDC/Aluminium.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:

INNOVIS PHARMA AEBE

Λεωφ. Μαραθώνος 144

15351 Παλλήνη, Αττική

Τηλ.: 2162005600

E-mail: info@innovispharma.gr

Παρασκευαστής:

PharmaPath ABEE

28^η Οκτωβρίου 1

12351 Αγία Βαρβάρα

Αθήνα, Ελλάδα

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 28/06/2023.